

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
01	点滴	(癌) プレドニン水溶性注	100mg	120mg
02	点滴抗癌剤	(癌) リクシマブ [®] BS点滴静注 「KHK」	375mg/m ²	450mg/m ²
04	点滴抗癌剤	(癌) ドキソルビシン塩酸塩注射用 「NK」	50mg/m ²	60mg/m ²
05	点滴抗癌剤	(癌) エンドキサン注射用	750mg/m ²	900mg/m ²
08	点滴抗癌剤	(癌) ポライビー点滴静注用	1.8mg/kg	2mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2							
01	点滴	大塚生食注2ポート100mL (癌)プレドニン水溶性注 療法名:血 DLBCL Pola-R-CHP q3W 1st 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【1 番目】	【1 番目】							
02	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlソフトバック (癌)リツシマブ®BS点滴静注 「KHK」 療法名:血 DLBCL Pola-R-CHP q3W 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴速度 50mL/h 投与経路:主管より	1本 0mg	【2 番目】								
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL グラニセトロン静注液(3mg)3mL 「サリ」 療法名:血 DLBCL Pola-R-CHP q3W 1st 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本 1A	【3 番目】								
04	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ドキシソルピシン塩酸塩注射用 「NK」 療法名:血 DLBCL Pola-R-CHP q3W 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【4 番目】								
05	点滴抗癌剤 ＜次ページあり＞	5%大塚糖注500mlソフトバック (癌)エンドキサン注射用 療法名:血 DLBCL Pola-R-CHP q3W 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で	1本 0mg	【5 番目】								

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2							
		投与経路:主管より										
06	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:血 DLBCL Pola-R-CHP q3W 1st 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本	【 6 番目】								
07	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:血 DLBCL Pola-R-CHP q3W 1st 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【 2 番目】								
08	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ポライビー点滴静注用 注射用水20ml 療法名:血 DLBCL Pola-R-CHP q3W 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A	【 3 番目】								
09	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:血 DLBCL Pola-R-CHP q3W 1st 点滴: *点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本	【 4 番目】								