

体表面積計算式: 体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)ポートラザ点滴静注液(800mg)50mL	800mg	800mg
05	点滴抗癌剤	(癌)ゲムシタビン点滴静注「ヤルト」	1250mg/m2	1320mg/m2
09	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「マルコ」	75mg/m2	79mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞(入)CDDP(q3W)+GEM+Neci(2W1R) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【1 番目】							【1 番目】	
02	点滴抗癌剤	生理食塩液バッグ「フソー」 250mL (癌)ポートラザ点滴静注液(800mg)50mL 療法名:呼 非小細胞(入)CDDP(q3W)+GEM+Neci(2W1R) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	200ml 0mg	【2 番目】							【2 番目】	
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞(入)CDDP(q3W)+GEM+Neci(2W1R) 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【3 番目】							【3 番目】	
04	点滴	デキサート注射液(6.6mg)2mL 生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞(入)CDDP(q3W)+GEM+Neci(2W1R) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1V 1本	【4 番目】							【4 番目】	
05	点滴抗癌剤	(癌)ゲムシタビン点滴静注「ヤルト」 大塚生食注2ポート100mL 療法名:呼 非小細胞(入)CDDP(q3W)+GEM+Neci(2W1R) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	0mg 1本	【5 番目】							【5 番目】	
06	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞(入)CDDP(q3W)+GEM+Neci(2W1R) 点滴:	1本	【6 番目】							【6 番目】	

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	
		*点滴時間 15分で 投与経路:主管より										
07	点滴	K N1号輸液500ml アスパラギン酸カリウム注10mEqキット10ml 硫酸M g 補正液(20mEq) 20ml 療法名:呼 非小細胞(入)CDDP(q3W)+GEM+Neci(2W1R) 点滴: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本 1本	【7 番目】								
08	点滴	K N1号輸液500ml アスパラギン酸カリウム注10mEqキット10ml デキサート注射液(6.6mg) 2mL パロノセトロン静注 (0.75mg) 5mL 「タイバ」 療法名:呼 非小細胞(入)CDDP(q3W)+GEM+Neci(2W1R) 点滴: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本 0.5V 1V	【8 番目】								
09	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「マルコ」 大塚生食注 500mL ソフトバッグ 療法名:呼 非小細胞(入)CDDP(q3W)+GEM+Neci(2W1R) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より	0mg 400ml	【9 番目】								
10	点滴	K N1号輸液500ml アスパラギン酸カリウム注10mEqキット10ml フロセミド注「トローワ」(20mg) 2mL 療法名:呼 非小細胞(入)CDDP(q3W)+GEM+Neci(2W1R) 点滴: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本 1A	10 番目								
11	点滴	K N1号輸液500ml アスパラギン酸カリウム注10mEqキット10ml 療法名:呼 非小細胞(入)CDDP(q3W)+GEM+Neci(2W1R) 点滴: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本	11 番目								