

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
01	点滴	(癌) プレドニン水溶性注	100mg	120mg
02	点滴抗癌剤	(癌) リクシマブ [®] BS点滴静注 「KHK」	375mg/m ²	450mg/m ²
04	点滴抗癌剤	(癌) ポライビー点滴静注用	1.8mg/kg	2mg/kg
07	点滴抗癌剤	(癌) ドキソルビシン塩酸塩注射用 「NK」	50mg/m ²	60mg/m ²
08	点滴抗癌剤	(癌) エンドキサン注射用	750mg/m ²	900mg/m ²

[illegible]

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
06	点滴	大塚生食注2ポート100mL グラニセトロン静注液(3mg)3mL「サリ」 療法名:血 DLBCL Pola-R-CHP q3W 2nd～ 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本 1A	【 6 番目】								
07	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ドキシソルピシン塩酸塩注射用「NK」 療法名:血 DLBCL Pola-R-CHP q3W 2nd～ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【 7 番目】								
08	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlソフトバック (癌)エンドキサン注射用 療法名:血 DLBCL Pola-R-CHP q3W 2nd～ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【 8 番目】								
09	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:血 DLBCL Pola-R-CHP q3W 2nd～ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本	【 9 番目】								