泌尿　**レジメン名称**：泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R　**インターバル日数**：47 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)パクリタキセルＮＫ	80mg/m2	84mg/m2
04	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注	2(AUC)	2.1(AUC)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml ファモチジン注射液 (20mg)2mL 「トーワ」 ポララミン注(5mg)1mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1A 1V	【１番目】							【１番目】	
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL グラニセトロン静注液(1mg)1mL「ｻﾜｲ」 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 1A	【２番目】							【２番目】	
03	点滴抗癌剤	５%大塚糖液250ml (癌)パクリタキセルＮＫ 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【３番目】							【３番目】	
04	点滴抗癌剤	５%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【４番目】							【４番目】	
05	点滴	５%糖液キットH 50mL 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【５番目】							【５番目】	
	＜次ページあり＞											

泌尿　**レジメン名称**：泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R　**インターバル日数**：47 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15	Day16	Day17	Day18
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml ファモチジン注射液 (20mg)2mL 「トーワ」 ポララミン注(5mg)1mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1A 1V						【１番目】			
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL グラニセトロン静注液(1mg)1mL「ｻﾜｲ」 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 1A						【２番目】			
03	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)パクリタキセルＮＫ 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【３番目】			
04	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【４番目】			
05	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本						【５番目】			
	＜次ページあり＞											

泌尿　**レジメン名称**：泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R　**インターバル日数**：47 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day19	Day20	Day21	Day22	Day23	Day24	Day25	Day26	Day27
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml ファモチジン注射液 (20mg)2mL 「トーワ」 ポララミン注(5mg)1mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1A 1V				【１番目】					
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL グラニセトロン静注液(1mg)1mL「ｻﾜｲ」 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 1A				【２番目】					
03	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)パクリタキセルＮＫ 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg				【３番目】					
04	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg				【４番目】					
05	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本				【５番目】					
	＜次ページあり＞											

泌尿　**レジメン名称**：泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R　**インターバル日数**：47 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day28	Day29	Day30	Day31	Day32	Day33	Day34	Day35	Day36
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml ファモチジン注射液 (20mg)2mL 「トーワ」 ポララミン注(5mg)1mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1A 1V		【１番目】							【１番目】
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL グラニセトロン静注液(1mg)1mL「ｻﾜｲ」 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 1A		【２番目】							【２番目】
03	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)パクリタキセルＮＫ 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg		【３番目】							【３番目】
04	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg		【４番目】							【４番目】
05	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:泌 尿路上皮CBDCA+PTX 6W1R 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本		【５番目】							【５番目】