





消化管 mapping 大腸


発表：森 豪史


通常觀察(肝弯曲)
7枚

























NBI觀察 3枚













ピオクタニン染色 4枚









内視鏡診断

鋸歯状病変疑い(SSL with carcinoma s/o)






部位:肝弯曲


大きさ:25mm 肉眼型:0-I s + 0-II a


拡大観察: JNET Type 1・2B/Pit pattern開Ⅱ型・Vi高度



深達度:SM



ESD















































4






4





4





4





4






4



4





4







4




SSL(無茎性鋸齒狀病変)










6



6





6




6




tub1





6



6





6



6







鋸齒狀病變



6

Desmin







粘膜筋板の構造が広く破壊・消失
→SM浸潤を認める

6

Desmin




1.1mm

壁深達度：T1b

6



HE



垂直断端陰性
(pVM0)

6


HE



側方断端陰性
(pHM0)

6


D2-40




リンパ管侵襲陰性
(Ly0)


6



EVG



静脈侵襲陰性
(V0)









- SSL
- adenocarcinoma
- adenoma


oral →






— SM



→
oral









- SSL
- adenocarcinoma
- adenoma



→
oral







— SM





→
oral








- SSL
- adenocarcinoma
- adenoma



— SM




→
oral


病理組織診断

Colom, hepatic flexure, ESD:


**Carcinoma in adenoma and sessile serrated lesion,
tubular adenocarcinoma, well differentiated type (tub1),
pTib(1.1mm), Ly0, V0, pHM0(2mm) pVM0(0.5mm)**


Mapping









- SSL
- adenocarcinoma
- adenoma













- SSL
- adenocarcinoma
- adenoma



— SM



SM高度浸潤所見

表 通常観察における SM 高度浸潤所見


肉眼型	SM 深部浸潤所見
隆起型	緊満感、凹凸不整、表面粗造、皺襞集中、ひきつれ
表面型	緊満感、凹凸不整、表面粗造、皺襞集中、ひきつれ、陥凹内隆起、陥凹内凹凸、深い陥凹、台状挙上、空気変形なし、易出血性、非腫瘍性の立ち上がり、LST-G における陥凹

LST-G : laterally spreading tumor-granular type

VⅠ 高度不整の所見

【所見】

- 1) pitの内腔狭小化
- 2) pit辺縁の不整
- 3) pitの輪郭不明瞭
- 4) pit間被覆上皮の染色性低下・消失
- 5) scratch sign



SSLDの特徴

- SSLに領域性のある異型上皮を伴ったもので、SSLの5-13%を占める。
- 通常内視鏡像では発赤、中心陥凹、二段隆起や結節を伴う。
- 異型上皮はNBI拡大像では JNET type2A以上を、ピオクタニン染色拡大像ではⅢ型pit以上が見られる。

